

NIT. 891200528

Folio:  FECHA DE IMPRESION: sábado 29 de diciembre de 2018 14:42:3 HOJA:  1/2

44  
47

**DATOS DEL PACIENTE**

Identificación: 1004134716 Edad: 16 Años \ 7 Meses \ 12 Días  
Nombre: DANIELA ESTEFANIA MORILLO PINTA Carpeta: 588017  
Dirección: VEREDA CHARGUAYACO Teléfono: 3024135133

**DATOS DEL INGRESO**

Ingreso: 808285 Consecutivo: 843848  
Entidad: ESS118 EMSSANAR ESS - ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE NARIÑO  
Fecha de Ingreso: 25/12/2018 04:56:12 Tipo Paciente: Subsidiado

**DATOS DE LA ATENCION**

Area Solicitante: GINECOBSTETRÍCIA Folio: 21  
Fecha Prescripción: San Juan de Pasto 29/12/2018 14:42:31 Cama: 363

**MEDICAMENTOS POS**

Cod. Medicamento	Descripción del medicamento	Concentración	Presentación	Cantidad
N02BA00111	ACETAMINOFEN 500mg TABLETAS	500 MG	TABLETAS	20

Cantidad en Letras: VEINTE  
POSOLOGIA: Acetaminofen tabletas de 500mg #20 (veinte). Tomar 1 tableta a las 8 am - 12 del día - 5 de la tarde y 10 de la noche  
VIA DE ADMINISTRACION: Oral Dias del Tratamiento: 0 ☐ DE CONTROL

Cod. Medicamento	Descripción del medicamento	Concentración	Presentación	Cantidad
B03AH011161	HIERRO ( FERROSO) SULFATO 300mg TAB	100-300 MG	TABLETA	30

Cantidad en Letras: TREINTA  
POSOLOGIA: Sulfato ferroso grageas de 300mg # 30 (treinta) Tomar 1 tableta después del almuerzo.  
VIA DE ADMINISTRACION: Oral Dias del Tratamiento: 0 ☐ DE CONTROL

Cod. Medicamento	Descripción del medicamento	Concentración	Presentación	Cantidad
J01GG003704	GENTAMICINA(SULFATO) 160mg/2mL SOLUCION INYECTABLE	160 mg/2 mL	SOLUCIÓN INYECTABLE	5

Cantidad en Letras: CINCO  
POSOLOGIA: Gentamicina 160 mg intramuscular #5 (cinco) una im cada día  
VIA DE ADMINISTRACION: Intramuscular Dias del Tratamiento: 0 ☐ DE CONTROL

Cod. Medicamento	Descripción del medicamento	Concentración	Presentación	Cantidad
P01AM02012	METRONIDAZOL 500mg TABLETAS	500mg	TABLETA	15

Cantidad en Letras: QUINCE  
POSOLOGIA: metronidazol tabletas de 500 mg una cada 8 horas por 5 días  
VIA DE ADMINISTRACION: Oral Dias del Tratamiento: 0 ☐ DE CONTROL

Cod. Medicamento	Descripción del medicamento	Concentración	Presentación	Cantidad
G02CB01211	BROMOCRIPTINA 2.5mg TABLETAS	2,5 mg	tableta	20


Cantidad en Letras: VEINTE  
POSOLOGIA: bromocriptina cap de 2.5cm una cada 12 horas por 10 días mas  
VIA DE ADMINISTRACION: Oral Dias del Tratamiento: 0 ☐ DE CONTROL

Cod. Medicamento	Descripción del medicamento	Concentración	Presentación	Cantidad
151802MQG010213	JERINGAS DESECHABLES DE 5cc(B3)		0	5

Cantidad en Letras: CINCO  
POSOLOGIA: para medicamento  
VIA DE ADMINISTRACION: Ninguno Dias del Tratamiento: 0 ☐ DE CONTROL

Diagnostico: 0364 ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA

VIGENCIA DE LA FORMULA MEDICA - 72 HORAS



Firma

PROF. MEDICINA: MORA SINZA CHRISTIAN CAMILO

Reg. Medico: 52511

Esp. MEDICINA GENERAL

Folio:	FECHA DE IMPRESION	sábado 29 de diciembre de 2018 14:42:3	HOJA	2/2
--------	--------------------	--	------	-----

NIT. 891200528

**DATOS DEL PACIENTE**

Identificación: 1004134716 Edad: 16 Años \ 7 Meses \ 12 Días  
Nombre: DANIELA ESTEFANIA MORILLO PINTA Carpeta: 588017  
Dirección: VEREDA CHARGUAYACO Teléfono: 3024135133

**DATOS DEL INGRESO**

Ingreso: 808285 Consecutivo: 843848  
Entidad: ESS118 EMSSANAR ESS - ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE  
SALUD DE NARIÑO  
Fecha de Ingreso: 25/12/2018 04:56:12 Tipo Paciente: Subsidiado

**DATOS DE LA ATENCION**

Area Solicitante: GINECOBSTERIA Folio: 21  
Fecha Prescripción: San Juan de Pasto 29/12/2018 14:42:31 Cama: 363

**INDICACIONES A PACIENTE**

Salida con


- Control en centro de salud primer nivel con médico general al recién nacido en 3 días y a la madre en una semana
- Consumir alimentación balanceada, rica en hierro
- Se explica SIGNOS Y SINTOMAS DE ALARMA; debe presentarse por urgencias si:
- Presenta fiebre sola o fiebre mas escalofrío
- Presenta dolor de cabeza intenso asociado a visión borrosa
- Tiene dificultades para la lactancia, enrojecimiento, o dolor de los senos
- Dolor abdominal intenso y agudo que no ceda a la ingesta de analgésicos comunes
- Sangrado vaginal abundante y/o fétido
- Hinchazón de miembros inferiores, manos o cara
- Para retiro de puntos de herida quirúrgica, solicite una cita a los 8 días en el centro de salud primer nivel
- No debe permanecer mucho tiempo en cama
- Utilizar preservativo para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
- Si desea embarazarse nuevamente, asistir a consulta preconcepcional

Asistir a programa de "Joven Sano"

**Fórmula Médica**

- Acetaminofen tabletas de 500mg #20 (veinte). Tomar 1 tableta a las 8 am - 12 del día - 5 de la tarde y 10 de la noche
- Sulfato ferroso grageas de 300mg # 30 (treinta) Tomar 1 tableta después del almuerzo.
- Gentamicina 160 mg intramuscular #5 (cinco) una im cada día
- metronidazol tabletas de 500 mg una cada 8 horas por 5 días
- bromocriptina cap de 2.5cm una cada 12 horas por 10 días mas

Firma



PROF. MEDICINA: MORA SINZA CHRISTIAN CAMILO

Esp. MEDICINA GENERAL

Reg. Medico: 52511