

DESCRIPCION QUIRURGICA

Paciente : GOMEZ GARCIA JOSE ALIRIO 1603000044
Identificacion : CEDULA C. 4245325
Edad : 54 Fecha : 2017/08/23
Sexo : MASCULINO Telefono : 5754792 3115144088
Direccion : CALLE 46 2 A 05 CASA Habitación: PISO 4 UCI - CAMA U408
Convenio : COOMEVA MEDICINA PREPAGADA

Via de Intervencion: UNICA VIA
Sala Quirúrgica : QUIROFANO Hora Ingreso QX: 14:00
Fecha Cirugia : 2016/03/02 Hora Final QX: 14:45

CIRUJANO (S): DR JAIRO MOYANO
AYUDANTE (S): DR FELIPE ARENAS
ANESTESIOLOGO (S): NO APLICA
AYUDANTE (S): NO APLICA
INSTRUMENTADORA: PATRICIA MOLINA
DIAGNOSTICO PRE-OPERATORIO:
SINDROME MIOFASCIAL
DIAGNOSTICO POST-OPERATORIO:
IDEM
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (S):
INFILTRACION DE PUNTOS GATILLO GUIADO POR ECOGRAFIA
CLASIFICACION DE LA HERIDA : LIMPIA

HALLAZGOS:
NO APLICA

TIPO DE ANESTESIA: LOCAL

COMPLICACIONES: NINGUNA

SANGRADO: NO SANGRADO

ANTIBIOTICO PROFILACTICO: NO **DOSIS UNICA:** NO

TEJIDOS ENVIADOS A ANATOMIA PATOLOGICA:
NO APLICA

MUESTRAS (O SECRECIONES) ENVIADAS A PATOLOGIA:
NO APLICA

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
Se identifica al paciente. Se canaliza vena. Se posiciona al paciente en decúbito supino sobre mesa quirurgica. Se monitoriza y se le administra oxígeno por cánula nasal a 2 litros por minuto. Sin sedacion. Se mantiene comunicación verbal coherente.

Se hace asepsia y antisepsia con solución tópica de clorhexidina gluconato al 2% y alcohol isopropilico al 70%.

Se hace pausa de seguridad a las 14: 25

Se identifica ocho puntos gatillo a nivel, en relacion con musculos paravertebrales dorsales.

Utilizando aguja espincan 25, se hace punción en plano y se avanza aguja

DESCRIPCION QUIRURGICA

Paciente	: GOMEZ GARCIA JOSE ALIRIO	1603000044
Identificacion	: CEDULA C. 4245325	
Edad	: 54	Fecha : 2017/08/23
Sexo	: MASCULINO	Telefono : 5754792 3115144088
Direccion	: CALLE 46 2 A 05 CASA	Habitación: PISO 4 UCI - CAMA U408
Convenio	: COOMEVA MEDICINA PREPAGADA	

Via de Intervencion: UNICA VIA

Sala Quirúrgica : QUIROFANO

Hora Ingreso QX: 14:00

Fecha Cirugia : 2016/03/02

Hora Final QX: 14:45

hasta localizar su punta a nivel de punto gatillo descrito. Se inyecta levobupivacaina al 0.175% 3 mililitros en cada punto gatillo. No punciones vasculares ni espinales. Procedimiento sin compilaciones. No se presentó parestesias.

El paciente es llevado a recuperación por 30 minutos. Se da de alta con recomendaciones orales y escritas.