

INFORME DE AUDITORÍA MÉDICA

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE

NOMBRE: DOLLY JOHANNA SALAMANCA CUTIVA
TIPO: CC
IDENTIFICACIÓN: 52903107
EDAD: 33 años
SEXO: FEMENINO
IPS: CLINICA DEL OCCIDENTE
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 25-03-2025

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Informe de Auditoría de la atención a Dolly Salamanca en Clínica de Occidente en marzo de 2015 bajo la cobertura de COLMEDICA MP, conciliación jurídica

2. RESUMEN DE LAS ATENCIONES:

20/03/2015 23:04. No contesta al segundo llamado en urgencias

21/03/15 01:28 **MOTIVO DE CONSULTA y ENFERMEDAD ACTUAL**

Cuadro de 1 hora de síncope con posterior episodio convulsivo, de duración no especificado, con posterior desviación de la mirada, emesis # 1, alimentaria, resto niegan, es traída por los familiares

Peso: 56 talla: 160 tensión arterial: 143 / 74 frecuencia respiratoria: 18

Examen físico:

cc pupilas isocóricas reactivas a la luz mucosa oral húmeda; cuello móvil no adenopatías c/p rscs continuos rítmicos no agregados, rs rs sin agregados; abd rsis (+) blando depresible no doloroso a la palpación no masas no megalias; genitourinario: no se explora; extremidades: hemiparesia miembro superior derecho; piel y faneras: sin alteraciones; neurológico: Consiente, afásica, Glasgow 13 /15, fuerza y sensibilidad disminuida en miembro superior derecho, frecuencia cardíaca: 80; temperatura: 37,0 escala análoga del dolor:

IDX: r418 Otros síntomas y signos que involucran la función síndrome de alteración del estado de conciencia

Descripción: ubicar en reanimación, fenitoína IV, Tac de cráneo simple, laboratorios, líquidos endovenosos, revalorar con resultados

Conducta

Tomografía computada de cráneo simple

Hemograma IV

Glucometría

Glucosa en suero u otro fluido diferente a orina

Sodio en suero u otros fluidos

Potasio en suero u otros fluidos

Cloro 1

Creatinina en suero. orina u otros

Electrocardiograma de ritmo o de superficie

Conducta

Sodio cloruro 0.9% solución inyectable x 500 ml administrar iv bolo por 500 cc, continuar 11121033 fenitoína sódica 250 mg 5 ml solución inyectable ampolla administrar 1 gr iv ahora, continuar 125 mg iv cada 8 horas 11114034 ranitidina clorhidrato 50 mg / 2 ml solución inyectable ampolla administrar 50 mg iv cada 8 horas 2 11114025 metoclopramida 10 mg / 2 ml solución inyectable ampolla aplicar 10 mg iv cada 8 horas 1

21/03/15 05:26 Diagnóstico y análisis subjetivo

Sincope con posterior episodio convulsivo, de duración no especificado, con posterior desviación de la mirada, emesis # 1, alimentaria, paciente consciente alerta activa,

TAC cerebral sin evidencia de lesiones aparentes realizar estudios complementarios

Dieta normal

Justificación de la hospitalización: manejo de ECV

21/03/15 05:32 Diagnóstico y análisis subjetivo

Cuadro de 1 hora de sincope con posterior episodio convulsivo, de duración no especificado, con posterior desviación de la mirada, emesis # 1, alimentaria, resto niegan, es traída por los familiares no se conocen antecedentes.

Paciente consciente alerta activo afasia pares craneanos oculomotores sin alteración pares bajos normales no asimetría facial fuerza hemiparesia derecha extremidades no signos meníngeos o cerebelosos rmt ++/++++

Paraclínicos, análisis y plan de manejo

TAC cerebral sin evidencia de lesiones aparentes se requiere estudio RM cerebral, estudio EEG, se hospitaliza

22/03/15 04:43

Diagnóstico y análisis subjetivo

Neurología

1- Convulsión de Novo, sin crisis, sin deterioro neurológico, en el momento asintomático

Neurología: paciente alerta activo consciente orientado pares craneanos sin alteración pupilas isocóricas reactivas a la luz, fotomotor directo y consensual presente no alteración de pares bajos no alteración de pares oculomotores no asimetría facial no alteración de la deglución fuerza simétrica 5/5 en grupos musculares de las 4 extremidades reflejos musculotendinoso ++/++++ no signos meníngeos ni cerebelosos

Paraclínicos, análisis y plan de manejo

Se espera estudio RM cerebral

22/03/15 05:48

Neurología

1- Convulsión de Novo

2 ECV CM izquierda

Se revisa RM cerebral infarto en región brazo anterior capsula interna y parietal izquierda probable origen trombótico, sin deterioro neurológico, en el momento asintomática

Análisis objetivo

Neurología

Paciente alerta activo consciente afasia motora orientado pares craneanos sin alteración pupilas isocóricas reactivas a la luz fotomotor directo y consensual presente no alteración de pares bajos no alteración de pares oculomotores no asimetría facial no alteración de la deglución hemiparesia izquierda reflejos musculo-tendinoso ++/++++ no signos meníngeos ni cerebelosos

Se solicita monitoreo electrocardiográfico continuo (holter) 881235 ecocardiograma transesofágico

22/03/15 22:22

Paciente con Dx anotados,

Familiar de la paciente (hermana). Solicita salida voluntaria.

Se le explica patología de la paciente y alto riesgo de complicación incluso la muerte por no asistencia médica, familiar argumenta que desea

Trasladar la paciente a otra institución donde se puedan hacer los estudios de manera más rápida, y firma salida voluntaria en constancia de esto.

Se le explica a paciente y familiar las implicaciones legales de una salida voluntaria.

3. ANALISIS DE CASO Y SOPORTE BIBLIOGRÁFICO

4. Diagnosis and Treatment of Acute Ischemic Stroke: An Update

5. *Universitas Medica*, vol. 60, núm. 3, 2019

6. Pontificia Universidad Javeriana

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

Fecha de recepción: 11/11/2018

Fecha de aprobación: 25/02/2019

DOI: <https://doi.org/10.11144/Javeriana.umed60-3.actu>

Resumen: El ataque cerebrovascular (ACV) agudo es la segunda causa de muerte en el mundo y genera costos elevados en su tratamiento y recuperación, así como un gran impacto socioeconómico, pues es la principal causa de discapacidad a largo plazo. Si bien la tomografía axial computarizada (TAC) cerebral simple sigue siendo la imagen recomendada por las guías internacionales para la evaluación inicial y toma de decisiones sobre el manejo del paciente con sospecha de ACV, en los últimos años ha habido extraordinarios avances en el diagnóstico oportuno y temprano del ACV con nuevas herramientas que van desde la estandarización de la angiotomografía cerebral como uno de los estudios principales en el enfoque inicial hasta el uso de técnicas de perfusión por tomografía y resonancia magnética (RM) cerebral, que permiten establecer el núcleo del infarto y el área circundante potencialmente salvable, por lo que es posible ofrecer terapias que brindan al paciente funcionalidad y calidad de vida a mediano y largo plazo. Teniendo en cuenta lo anterior, es vital actualizar los métodos diagnósticos actuales disponibles en el país y las distintas terapias disponibles, según sea el caso de cada paciente, para el ACV isquémico agudo, con un enfoque clínico práctico y aplicable al escenario actual de salud en Colombia.

Introducción: La enfermedad cerebrovascular es un término jerárquicamente amplio. Es un síndrome que incluye un grupo de enfermedades heterogéneas con un punto en común: una alteración en la vasculatura del sistema nervioso central, que lleva a un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y los requerimientos de oxígeno, cuya consecuencia es una disfunción focal del tejido cerebral (1,2). El accidente cerebrovascular (ACV), por otra parte, se refiere a la naturaleza de la lesión, y se clasifica en dos grandes grupos: isquémico y hemorrágico. El ACV isquémico agudo se genera por oclusión de un vaso arterial e implica daños permanentes por isquemia; no obstante, si la oclusión es transitoria y se autorresuelve, se presentarán manifestaciones momentáneas, lo cual haría referencia a un ataque isquémico transitorio, que se define como un episodio de déficit neurológico focal por isquemia cerebral, de menos de 60 minutos de duración, completa resolución posterior, y sin cambios en las neuroimágenes (2). Por otro lado, el ACV de origen hemorrágico es la ruptura de un vaso sanguíneo que lleva a una acumulación hemática, ya sea dentro del parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo (2). El ACV agudo es una emergencia neurológica frecuente, con 17 millones de casos anuales en el mundo (3,4), y es la segunda causa de muerte después de la enfermedad coronaria (3,5), con 6,5 millones de pérdidas al año. Representa una alta carga de morbilidad y genera altos costos en atención médica inicial, tratamiento y rehabilitación en los distintos sistemas de salud del mundo. Por eso, en los últimos años se han desarrollado múltiples terapias de manejo que buscan disminuir la mortalidad, brindando funcionalidad y calidad de vida. Es vital dar a conocer las nuevas herramientas disponibles para el diagnóstico oportuno, desde la estandarización de la angiotomografía cerebral como estudio inicial hasta técnicas de perfusión por tomografía y resonancia magnética (RM) cerebral, que permiten establecer el núcleo del infarto y el área circundante potencialmente salvable. El objetivo de esta revisión es presentar una actualización sobre los métodos diagnósticos actuales y las distintas terapias disponibles según sea el caso de cada paciente, para el ACV isquémico agudo, con un enfoque clínico práctico, ordenado y aplicable al escenario actual de salud en Colombia.

Epidemiología: El ACV isquémico agudo constituye la quinta causa de muerte en Estados Unidos y la cuarta en el Reino Unido, la cual varía según la raza y la etnia, pues es casi dos veces más alto en la población afroamericana. En Estados Unidos se registran anualmente 610.000 casos nuevos y 185.000 casos recurrentes, de los cuales hasta el 87% es de origen isquémico y generan costos de aproximadamente 34 billones de dólares por año (6). Es la causa más importante de discapacidad grave a largo plazo con consecuencias catastróficas para el paciente y su familia. Se prevé que el ACV representará el 6,2% de la carga total de la enfermedad en los países desarrollados en el 2020. Los datos estadísticos en Colombia son escasos. El estudio Epineuro, publicado en el 2003, determinó la prevalencia de ocho problemas neurológicos frecuentes y encontró que para el ACV la prevalencia fue del 19,9%, más frecuente en mayores de 50 años y mujeres. Adicionalmente, se cuenta con una base de datos que muestra las tromboembolismos y trombósis llevadas a cabo en Colombia entre 2011 y 2015 e identifica que Bogotá es la ciudad con el mayor número de procedimientos en el país (6).

Fisiopatología: Autorregulación cerebral El flujo sanguíneo cerebral (FSC) está determinado por la resistencia vascular cerebral, directamente relacionada con su diámetro. Es el proceso por medio del cual el FSC se mantiene constante a pesar de variaciones en la presión de perfusión. El mantenimiento del FSC ocurre dentro de un rango de presión arterial media de 60 a 150 mm Hg. Fuera de este rango, el cerebro no puede compensar los cambios en la presión de perfusión, ya que aumenta el riesgo de isquemia a bajas presiones y edema a altas presiones (7). El ACV isquémico disminuye el FSC y la presión de perfusión cerebral. En el estadio I, el FSC se mantiene constante gracias a la dilatación máxima de arterias y arteriolas, lo que produce un aumento compensatorio en el volumen sanguíneo cerebral. En el estadio II, cuando se agota la vasodilatación máxima, la fracción de extracción de oxígeno se incrementa para mantener la oxigenación y el metabolismo del tejido cerebral. En el estadio III, cuando en el núcleo isquémico se supera el rango autorregulatorio disminuye el volumen y el FSC hasta que la circulación colateral falla, ocasionando muerte celular (8,9,10,11). cascada isquémica

La isquemia genera una cascada de eventos que conducen a muerte neuronal; incluye disminución en la producción de adenosín trifosfato (ATP); cambios en las concentraciones de sodio, potasio y calcio; aumento de lactato; acidosis; acumulación de radicales libres; acumulación intracelular de agua, y estimulación persistente de los receptores de glutamato (12).

Las cinasas de proteínas dependientes de calcio, la fosfolipasa A2, el óxido nítrico sintetasa (SON), las endonucleasas y las proteasas se activan, acumulando sodio y calcio intraneural que revierte la absorción del glutamato en los astrocitos; a la vez que aumenta la excitotoxicidad y la activación de fosfolipasas que lesionan la membrana celular, proteasas que fragmentan el ADN y el citoesqueleto,

lipooxigenasas, ciclooxigenasas, oxidasa de xantinas y SON, que aumentan los radicales libres citotóxicos, ácidos grasos libres y derivados del ácido araquidónico.

La activación del receptor N-metil-D-aspartato (NMDA) lleva a la producción de óxido nítrico. La actividad de la SON y la cantidad de óxido nítrico aumentan después de la exposición a la hipoxia (15). El óxido nítrico sintetasa (SON) neuronal y el SON inducible generan mayores cantidades de óxido nítrico, al lesionar componentes celulares; además, puede reaccionar con el anión superóxido, produciendo peroxinitrito, que fragmenta cadenas simples del ADN y activa apoptosis (16).

Necrosis y apoptosis: La muerte celular después de la isquemia ocurre por necrosis o por apoptosis. La inflamación aumenta el FSC a la región isquémica, que puede suministrar glucosa y oxígeno a las células; sin embargo, este aumento del FSC libera calcio, que resulta en aumento del daño tisular (7,17). La necrosis predomina en el centro del infarto y la apoptosis en el área de penumbra isquémica

La necrosis se acompaña de edema celular, lesión del tejido circundante, lisis de la membrana celular y lesión de los organelos. La circulación colateral produce energía suficiente para permitir la expresión de proteínas que median la apoptosis. Los fragmentos celulares generados conforman el “cuerpo apoptótico” (13). La apoptosis se genera mediante una serie de cambios que incluye las caspasas 1, 3, 8, 9 y 11, que activan factores que destruyen proteínas clave para la supervivencia (20).

Penumbra isquémica: Es el área de tejido que rodea el centro del infarto, con afectación funcional pero potencialmente viable. La isquemia incluye áreas que se recuperan espontáneamente, denominadas áreas de oligohemia benigna, y áreas que pueden progresar a cambios irreversibles, denominadas áreas de penumbra. La progresión a infarto depende del grado de circulación colateral, la duración de la lesión y el metabolismo celular. La oligohemia benigna se asocia a FSC mayor de 17 ml por minuto por cada 100 g de tejido; la penumbra isquémica a valores entre 10 y 17 ml por minuto por cada 100 g de tejido; y el core del infarto, a menos de 10 ml por minuto por cada 100 g de tejido. Aproximadamente, el 10% de los ACV isquémicos se clasifican como malignos, debido a la presencia de edema cerebral, aumento de presión intracraneal y herniación cerebral (22). Los dos mecanismos fisiopatológicos del edema son citotóxico y vasogénico. En el edema citotóxico, la isquemia por estrés oxidativo genera expresión de canales no selectivos, como el receptor tipo 1 para la sulfonilurea y el NCca-ATP, que ingresan masivamente sodio a la célula. La apertura de estos canales se efectúa 2 a 3 horas después del inicio de la lesión isquémica y se desencadena por la disminución del ATP. El resultado es la acumulación de agua intraneuronal (23,24). El edema vasogénico es causado por el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, permitiendo que macromoléculas entren en el espacio extracelular, lo que aumenta el volumen de fluido a este nivel (23).

Etiología: Existen 5 categorías etiológicas del ACV según la escala de TOAST (25), y su categorización ha probado ser benéfica al optimizar el tratamiento específico de cada paciente. Enfermedad aterotrombótica-aterosclerótica de gran vaso: la isquemia es generalmente de tamaño medio o grande, de topografía cortical o subcortical y localización vertebrobasilar o carotídea. Debe cumplir uno de los dos criterios: Aterosclerosis con estenosis: estenosis > 50% de diámetro luminal u oclusión de la arteria extracraneal correspondiente o de la arteria intracraneal de gran calibre. Aterosclerosis sin estenosis: estenosis < 50% en ausencia de otra etiología y con al menos dos de los siguientes factores de riesgo: > 50 años, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia o tabaquismo. Cardioembolismo: isquemia de tamaño medio o grande, de topografía cortical en la que existe alguna cardiopatía de características embolígenas. Enfermedad oclusiva de pequeño vaso infarto lacunar: isquemia de pequeño tamaño < 1,5 cm de diámetro en el territorio de una arteria perforante cerebral que puede ocasionar un síndrome lacunar. Otras causas: isquemia de tamaño variable de localización cortical o subcortical, en territorio carotídeo o vertebrobasilar, en un paciente en el que se han descartado las tres anteriores. Se puede producir por enfermedades sistémicas, alteraciones metabólicas, alteraciones de la coagulación, disección arterial, displasia fibromuscular, migraña, malformación arteriovenosa, etc. De origen indeterminado: por estudio incompleto, por más de una etiología o por origen desconocido y estudio completo (26,27).

Cuadro clínico: Los signos y síntomas se manifiestan según la localización y extensión de la lesión (28). Los principales territorios vasculares que pueden verse alterados son: Circulación anterior: arteria carótida interna, arteria cerebral media y anterior. Arteria cerebral anterior: presentará hemiparesia e hipoestesia contralateral de predominio crural, disartria, incontinencia urinaria, apatía, abulia, desinhibición y mutismo acinético en caso de daño bilateral. Arteria cerebral media en su porción más proximal (M1) presentará hemiplejía e hipoestesia contralateral, hemianopsia homónima, desviación

forzada de la mirada, alteración del estado de conciencia y afasia si se afecta el hemisferio dominante. Las porciones M2-M3 se presentarán con hemiparesia e hipoestesia contralateral, disartria, afasia si se afecta el hemisferio dominante, y hemiamopsia homónima en compromiso de M2. Si el daño es en la porción M4, presentará los mismos signos y síntomas, pero de forma menos severa, y presentará más afectación de funciones corticales como el lenguaje, así como disgrafia, discalculia, agrafía, apraxias o debutar con crisis. Circulación posterior: arteria cerebral posterior, arteria basilar y arteria vertebral. Arteria cerebral posterior: afectación del campo visual contralateral, agnosia visual, o ceguera cortical o crisis visuales. Territorio vertebrobasilar: pueden presentar compromiso cerebeloso o troncoencefálico de acuerdo con la arteria afectada. Existe daño de la punta de la basilar, que se presentará con compromiso del estado de conciencia, alteraciones pupilares u oculomotoras, cerebelosas, y compromiso motor de las cuatro extremidades, que en caso de no ser identificado y tratado, puede llevar al paciente a la muerte en pocas horas. En la evaluación inicial se utiliza la escala del National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS), para evaluar la severidad del cuadro clínico

Ayudas diagnósticas: El diagnóstico del ACV isquémico agudo es clínico y los estudios imagenológicos se realizan con el fin de detectar hemorragia, evaluar el grado de lesión e identificar el territorio vascular afectado (29).

Dentro de los estudios imagenológicos que se exponen a continuación habrá mayor o menor disponibilidad de acuerdo con el centro clínico, el acceso a una unidad de ACV y la ciudad; así, la mayoría de estudios descritos están disponibles en ciudades principales del país, como Bogotá, Cali, Medellín, entre otras, y en lugares de bajo acceso se dispone de TAC cerebral simple, con opción de remisión a ciudades intermedias para realización de RM cerebral. La tomografía axial computarizada (TAC) cerebral simple es la imagen recomendada por la Asociación Americana del Corazón (AHA) para la evaluación inicial y toma de decisiones sobre el manejo del paciente con sospecha de ACV, ya que la TAC es ampliamente disponible, tiene una alta sensibilidad y es relativamente rápida (30). Se recomienda su toma en los primeros 20 minutos de llegada al centro médico con el objetivo de diferenciar el ACV isquémico del hemorrágico, ya que este último contraindicaría el tratamiento con rtPA (31,32).

La TAC simple permite calcular el Alberta Stroke Program Early Computed Tomography Score (ASPECTS), una escala cuantitativa (figura 4) para medir signos tempranos de isquemia cerebral (33). Para calcularlo se utilizan dos cortes axiales: el primero en los ganglios basales y el segundo en los ventrículos laterales y se divide el territorio de la arteria cerebral media (ACM) en diez regiones: En el primer corte se debe valorar el núcleo caudado (C), lenticular (L), rodilla de la cápsula interna, brazo posterior (IC) y corteza insular (I). En cuanto a los territorios de la arteria cerebral media, se debe valorar la corteza anterior de la ACM (M1), la corteza lateral adyacente al ribete insular (M2) y la corteza posterior de la ACM (M3), es decir, siete áreas.

En el segundo corte se debe valorar el territorio anterior de la ACM (M4), el territorio lateral de la ACM (M5) y el territorio posterior de la ACM (M6), es decir, tres áreas. Lesiones hipodensas en alguna de esas 10 áreas resta un punto en la escala. Un puntaje de 10 implica un estudio normal y un puntaje de 0 indica afectación de todo el territorio de la ACM. El puntaje mínimo aceptado para ofrecer terapia trombolítica es de 7, un puntaje menor se relaciona con menor beneficio terapéutico (34). En la TAC también se pueden observar otros elementos como cambios isquémicos tempranos dados por hipodensidades leves del parénquima con pérdida de la diferenciación de las sustancias gris y blanca. Los infartos antiguos que se observan como hipodensidades bien definidas del parénquima y la hiperdensidad de una arteria se asocia con oclusión trombótica de grandes vasos (30).

La angiografía por tomografía computarizada (angio-TAC) de cerebro y vasos de cuello requiere medio de contraste yodado endovenoso, que permite evaluar la anatomía vascular arterial. Es útil para detectar áreas de oclusión o estenosis y para identificar enfermedad vascular extracraneana (31,34). La angio-TAC también es útil para caracterizar la morfología del trombo, ya que la longitud de este es uno de los factores predictores del desenlace funcional del paciente (35). Se ha demostrado que la angio-TAC es confiable para la evaluación de grandes vasos intracraneales, pues la AHA lo recomienda para pacientes candidatos a terapia endovascular (32). En cuanto a la circulación colateral, algunos estudios han mostrado que la presencia de buenas colaterales se asocia con mejor respuesta a la trombólisis, la terapia endovascular y la reducción del volumen del core isquémico (36); otros estudios apoyan que los pacientes con pobres colaterales están predispuestos a complicaciones hemorrágicas y muerte después de la terapia endovascular (37). Sin embargo, un reciente estudio en pacientes llevados a terapia endovascular con ventana mayor a 6 horas mostró que la presencia de

buenas colaterales en angio-TAC solo se asoció con un volumen del core isquémico más pequeño y una reducción en su crecimiento; pero no influyó en desenlaces como independencia funcional medida por Rankin, ni en el éxito de la terapia endovascular o reducción en las complicaciones hemorrágicas o la muerte (38). Por lo anterior, si bien la circulación colateral puede proveer un flujo sanguíneo crucial en los pacientes con ACV (39), no debe ser un criterio único a la hora de incluir o excluir pacientes para realización de terapia trombolítica o endovascular. La TAC cerebral por perfusión es la imagen de elección para evaluar el área de penumbra isquémica. Requiere la administración de medio de contraste y muestra imágenes del FSC, el volumen sanguíneo cerebral (VSC) y el tiempo de tránsito medio (TTM) (31).

VSC: es el volumen total de sangre que contiene una determinada zona cerebral y se mide en milímetros de sangre por 100 gramos de tejido cerebral (ml/100 g) (8,34).

FSC: es el volumen de sangre que atraviesa una determinada zona cerebral por unidad de tiempo, medido en mililitros de sangre por 100 gramos de tejido por minuto (ml/100 g/min) (8,34).

Tiempos de circulación medidos en segundos, dentro de los que se incluyen: el TTM y el tiempo máximo (T_{máx}), este último —cuyo valor normal es 0— refleja el suministro normal de sangre al tejido sin demora (8,34).

El TTM marca las áreas isquémicas y también incluye áreas limítrofes; es el parámetro más sensible para detectar la disminución de perfusión cerebral. El FSC delimita el área de isquemia crítica y el VSC delimita el área de necrosis ya instaurada. Los mapas de VSC y FSC generalmente muestran áreas de anormalidad más pequeñas que TTM, por lo tanto, son más específicos para las áreas de isquemia e infarto (40).

El core en un TAC por perfusión está definido como el área que tiene un FSC menor al 30% del identificado en el hemisferio sano. El T_{máx} mayor a 6 segundos muestra una zona isquémica del parénquima, pero aún no necrótica. Por esto, para definir el área de penumbra se usa la técnica de mismatch, definida como la diferencia entre la zona de necrosis y la de isquemia. Es decir, la zona de penumbra resulta de restar el core del área con T_{máx} mayor a 6 segundos (41,42). Los estudios DAWN (DWI or CTP Assessment with Clinical Mismatch in the Triage of Wake-Up and Late Presenting Strokes Undergoing Neurointervention with Trevo) (41) y DEFUSE 3 (Endovascular Therapy Following Imaging Evaluation for Ischemic Stroke) (42) han demostrado la factibilidad de terapia endovascular con ventana de 6 a 24 horas, en pacientes con oclusión de gran vaso y neuroimágenes con evidencia penumbra isquémica. En dichos estudios, en pacientes elegibles, esta terapia influye en términos de discapacidad a los 90 días. La AHA recomienda imágenes de perfusión en pacientes con las consideraciones mencionadas.

Resonancia magnética (RM) cerebral: dentro de las secuencias de RM convencional, la secuencia diffusion-weighted imaging (DWI) es útil para identificar cambios isquémicos tempranos, al detectar infarto hasta en un 95% de las ocasiones. Una lesión isquémica aguda se verá de alta señal en el DWI, y se debe corresponder con una lesión de baja señal, en la misma localización, en el mapa de apparent diffusion coefficient (ADC). El tamaño del core es determinante en el pronóstico de estos pacientes. A mayor volumen de infarto, aumenta la probabilidad de desenlaces desfavorables. La RM cerebral no es un estudio de rutina para la evaluación inicial, ya que puede tardar mucho tiempo en completarse y tiene menor disponibilidad que la TAC (31).

En RM, el mismatch se realiza al comparar las imágenes potenciadas por perfusión (PWI) y el DWI. El área que muestra anomalías tanto de difusión como de perfusión representa un tejido infartado; mientras que el área que muestra solo anomalías de perfusión y tiene una difusión normal corresponde con el área de penumbra (43). En los ACV de tiempo indeterminado, las secuencias DWI, ADC y FLAIR precisan el tiempo de evolución de la lesión; imágenes de alta señal en DWI sin correspondencia en el FLAIR implican un tiempo menor de 4,5 horas con una sensibilidad del 62% y una especificidad del 78%.

La angiografía por RM cerebral es útil para detectar oclusión o estenosis de la circulación intra- y extracraneal. Puede realizarse con contraste o sin este, aunque se prefiere el uso de contraste, por su mayor calidad de imagen; sin embargo, no es superior a la angio-TAC (31,43).

La panangiografía cerebral consiste en la inserción de un catéter en la arteria femoral o braquial, que se dirige hasta los vasos cerebrales y se inyecta medio de contraste con toma de imágenes secuenciales para observar su paso por los vasos sanguíneos (parenquimograma). El uso de catéter hace posible el objetivo terapéutico del procedimiento, por medio de colocación de stent o trombectomía aspirativa (44). Los pacientes candidatos a terapia endovascular deben cumplir los siguientes criterios (32):

Rankin previo menor a 2.

Edad mayor a 18 años.

NIHSS mayor a 8.

ASPECTS mayor a 6.

Inicio de la intervención dentro de las primeras 6 horas de los síntomas.

La escala Thrombolysis in Cerebral Infarction (TICI) (33) evalúa los hallazgos angiográficos después del tratamiento intraarterial. Califica la revascularización/reperfusión posterior al procedimiento (8). Los puntajes son:

0: sin flujo anterógrado.

1: flujo que es posterior a la oclusión, pero sin reperfusión tisular.

2a: reperfusión tisular parcial en < 66% del territorio de la arteria ocluida.

2b: reperfusión tisular completa del territorio de la arteria ocluida pero enlentecida respecto a la arteria homóloga contralateral.

3: reperfusión tisular completa y sin retraso.

Se ha demostrado una reducción significativa de la mortalidad en TICI 2b y 3, comparado con puntajes de TICI más bajos (12,8% versus 39,1%, respectivamente). Por lo tanto, se considera un TICI 2b o 3 como un resultado angiográfico exitoso (45).

Tratamiento

Medidas generales y de soporte

Se recomienda el soporte de la vía aérea y asistencia ventilatoria como parte del manejo en pacientes con ACV, que presenten alteración del estado de conciencia o disfunción bulbar que afecte la vía aérea (nivel I, clase C). Además, se recomienda lograr saturaciones de oxígeno mayores a 94%, aun si esto implica el uso de oxígeno suplementario (nivel I, clase C). La temperatura > 38 °C debe tratarse con antipiréticos (nivel I, clase C). La hiperglucemia persistente durante las primeras 24 horas posteriores a un ACV se asocia con un peor desenlace. Se recomiendan niveles de entre 140 y 180 mg/dL y evitar la hipoglucemia (nivel IIa), la cual debe tratarse cuando sea < 60 mg/dL (nivel I, clase C). Se deben usar antihipertensivos cuando las cifras de tensión arterial sean iguales o mayores a 220/120 mm Hg, sin descensos menores al 15% en las primeras 24 horas. Los pacientes candidatos a terapias de reperfusión deben mantener una presión arterial menor a 185/110 mm Hg (nivel I, clase B), y los pacientes que ya han sido llevados a terapia de reperfusión deben mantener una tensión menor a 180/105 mm Hg, durante las primeras 24 horas después del tratamiento (1,32).

Terapia trombolítica

Las terapias de reperfusión en ACV isquémico agudo son:

Trombólisis intravenosa (IV).

Trombólisis intraarterial (IA).

Trombectomía mecánica.

Ventanas de reperfusión para pacientes con ACV isquémico agudo: el tiempo de ventana para terapias de reperfusión se empieza a contar a partir de la “última vez que fue visto normal” o cuando un testigo lo cuantifica.

Trombólisis IV con alteplase (tabla 3)

Ventana estándar: 0-3 horas

Ventana extendida: 3-4,5 horas

Contraindicaciones para la trombólisis IV con alteplasa

Dentro de las contraindicaciones para la trombólisis IV con alteplasa se encuentran pacientes con tiempo de evolución indeterminado o con tiempo > 4,5 horas, evidencia de hemorragia intracraneal o evidencia de compromiso isquémico extenso y ya instaurado en la TAC cerebral simple. Así mismo, son contraindicación el haber presentado un ACV isquémico, trauma craneoencefálico severo o cirugía intracraneal/espinal en los últimos 3 meses, o punción arterial de vaso no compresible en los 7 días previos. El antecedente de neoplasia gastrointestinal (GI) o sangrado GI en los 21 días previos, o tener una malformación vascular intracraneal no rota, no tratada, se considera de alto riesgo y potencialmente peligroso. Dentro de los exámenes complementarios, es contraindicación tener más de 10 microsangrados en la RM cerebral, plaquetas < 100.000/mm³, INR > 1,7, PTT > 40 s, PT > 15 s; también el tratamiento con heparinas de bajo peso molecular a dosis plena en las últimas 24 h, antiplaquetarios inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa, tratamiento con inhibidores directos de la trombina (Dabigatrán) o inhibidores del factor Xa (Fondaparinux, Rivaroxabán, Apixabán), a menos que tengan pruebas de laboratorio normales o que la última dosis haya sido > 48 h con función renal normal, entre otras contraindicaciones relativas o absolutas, como lo son la sospecha de endocarditis infecciosa, disección aórtica o la presencia de un trombo cardíaco intracavitario o neoplasia cerebral intraaxial, por el riesgo de sangrado (32,46).

Indicaciones de administración de alteplasa IV para ACV isquémico agudo en ventana

Calcular la dosis total de ALTEPLASA intravenoso a 0,9 mg/kg (máximo 90 mg de dosis total). Aplicar el 10% de la dosis en bolo en 1 minuto y el resto en infusión continua en 1 h. Ingresar al paciente en unidad de cuidado intensivo o unidad de stroke para monitoreo. Si el paciente desarrolla cefalea severa, náuseas, vómito, hipertensión aguda o empeoramiento del examen neurológico, se debe suspender la infusión y tomar urgente una TAC cerebral simple. Medir la tensión arterial y realizar examen neurológico así:

Cada 15 min durante la infusión, y en las primeras 2 h posterior a esta.

Cada 30 min durante las siguientes 6 h.

Cada 60 min dentro de las primeras 24 h de tratamiento.

Incrementar la frecuencia de medición de la TA si la TAS > 180 mm Hg o si la TAD > 105 mm Hg; administrar medicación antihipertensiva para mantener la TA por debajo de estos niveles. Se debe evitar el uso de sonda nasogástrica, sonda vesical o catéter de presión intraarterial si el paciente se puede manejar de forma segura sin ellos. Obtener una TAC cerebral simple de control o RM cerebral a las 24 h después de la terapia con alteplasa IV, y antes de iniciar anticoagulantes o antiplaquetarios.

Complicaciones de la trombolisis intravenosa

El angioedema orolingual es un efecto adverso al TPA, alcanzando una incidencia del 1 al 5%. En caso de presentarse, inicialmente es fundamental asegurar la vía aérea. Si el edema se limita a los labios o la parte anterior de la lengua, la intubación orotraqueal (IOT) puede no ser necesaria; sin embargo, si el edema afecta la laringe, el paladar, el piso de la boca o la orofaringe, con rápida progresión (30 minutos), tiene alto riesgo de requerir IOT. Idealmente, debe hacerse en secuencia rápida con el paciente despierto. Puede requerirse intubación nasal; sin embargo, con riesgo de epistaxis postalteplasa IV. Debe suspenderse la infusión de alteplasa y de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, en caso de que se estén administrando, así como iniciar manejo con metilprednisolona de 125 mg IV, difenhidramina de 50 mg IV o ranitidina de 50 mg IV. En caso de persistencia del angioedema, administre adrenalina (0,1%) 0,3 mL subcutáneo o 0,5 mL nebulizado. El Icatibant, un antagonista selectivo de los receptores de bradiquinina B2, se usa con éxito en casos de angioedema hereditario y asociado a inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; pero no está disponible en nuestro país (32,47,48).

El sangrado intracerebral sintomático relacionado con la administración de alteplasa IV puede presentarse hasta en el 7% de los pacientes; y es mucho más baja la presentación (0,4-0,9%) cuando se usan trombolíticos con indicación diferente a la de ACV isquémico agudo. Aproximadamente, el 40% de estos pacientes hace expansión del hematoma, que lleva a una mortalidad de hasta el 61%, a 3 meses.

En caso de existir sospecha de sangrado intracerebral, ya sea por alteración del estado de conciencia, nueva o mayor focalización neurológica, crisis convulsiva durante la infusión, entre otras, debe suspenderse la infusión de alteplasa y trasladar al paciente a toma de TAC cerebral simple de forma inmediata; realizar de manera paralela hemograma, PT, PTT, fibrinógeno y hemoclasificación. En caso de confirmarse el sangrado, se debe iniciar manejo con crioprecipitados de 10 unidades en infusión durante 10 a 30 min, con posibilidad de aplicación de dosis adicionales, en caso de que haya concentraciones de fibrinógeno por debajo de 200 mg/dL. Se continúa con infusión IV de 1 g de ácido tranexámico en 10 min. Debe ser valorado por hematología y neurocirugía para evaluar medidas adicionales y se debe brindar una terapia general de soporte, que incluye, entre otros, control de tensión arterial, temperatura y glucemia (32,47,48).

Trombólisis intraarterial (32)

El tratamiento inicial con trombólisis intraarterial es benéfico para pacientes seleccionados con ACV isquémico mayor, < 6 h de duración, con oclusión de ACM (recomendación grado I).

Trombectomía mecánica (32)

Pacientes elegibles para trombólisis IV en ventana estándar o extendida deben recibir terapia endovascular si cumplen todos los siguientes criterios (recomendación IA):

Escala Rankin modificada previa a ACV: mRS 0-1.

Etiología de ACV: oclusión de arteria carótida interna (ACI) o ACM M1.

Escala ≥ 18 años.

Escala de NIHSS ≥ 6 .

ASPECTS ≥ 6 .

Tratamiento puede ser iniciado (tiempo aguja) en 6 horas desde el inicio de los síntomas.

Desde los primeros estudios pivotaes de trombolisis IV, IA y trombectomía mecánica, se conocen buenas tasas de recanalización con terapias solas y combinadas, como es el caso del Mechanical Embolus Removal in Cerebral Ischemia (MERCI 1), que mostró una recanalización exitosa (TICI 2-3) en el 43% de los pacientes, y en el 64% con alteplasa IV adicional. Así mismo, en el PENUMBRA (Penumbra System) y RECAST (Rescue, Combined, and Stand-Alone Thrombectomy in the Management of Large Vessel Occlusion Stroke Using the Solitaire Device) se alcanzaron tasas

exitosas de recanalización (TICI 2-3) en el 81,6% y el 88% de los pacientes, respectivamente (49,50,51). Teniendo en cuenta los resultados de los estudios clínicos que emplean stents para la trombectomía mecánica (SWIFT, MR. CLEAN, EXTEND-IA, ESCAPE y REVASCAT), el 29 de junio de 2015 se publicó la actualización de las guías de manejo temprano de pacientes con ACV isquémico agudo con manejo endovascular de la AHA/ASA, concluyendo que la información obtenida en estos estudios permite una recomendación clase I, nivel de evidencia A para la trombectomía mecánica con stent, para un grupo seleccionado de pacientes (52,53,54,55,56).

Manejo médico y prevención secundaria

Antiplaquetarios. Tanto en la guía de STROKE 2018 como en la guía de práctica clínica colombiana se recomienda la administración de antiagregantes plaquetarios para el manejo del ACV isquémico agudo como prevención secundaria. Se debe iniciar esta terapia dentro de las primeras 24-48 h de iniciados los síntomas; no obstante, en pacientes que recibieron manejo trombolítico con alteplasa se sugiere esperar 24 h antes de iniciar la terapia antiagregante, aunque es importante evaluar cada caso de manera individual teniendo en cuenta los riesgos y beneficios para iniciar la terapia en el momento más oportuno (1,32). En cuanto a la antiagregación dual, no hay suficiente evidencia para recomendar su uso rutinario para el tratamiento de pacientes con ACV que no tengan indicación específica para tal (1).

Estatinas En un metanálisis de 42 estudios y más de 82.000 pacientes se encontró que el uso de estatinas reduce la incidencia de ACV en hasta el 41% con atorvastatina (57). Se cree que esto es secundario a la reducción de los niveles séricos de colesterol de baja densidad (LDL) y a los efectos pleiotrópicos de las estatinas, que incluyen efectos antiinflamatorios, antioxidantes y neuroprotectores (57). En el estudio SPARCL se demostró que el tratamiento con 80 mg de atorvastatina al día reducía el riesgo de ACV en pacientes sin enfermedad coronaria conocida y LDL entre 100 y 190 mg/dL, quienes hubieran tenido un ACV o ataque isquémico agudo (AIT) reciente (58). Si no existe contraindicación, se iniciará atorvastatina 80 mg/día dentro de las primeras 24 a 48 h después del ACV (1).

Anticoagulación. Tanto la guía de STROKE 2018 como la guía de práctica clínica colombiana no recomiendan el uso urgente de anticoagulantes con el objetivo de prevenir recurrencia de ACV, evitar deterioro neurológico o mejorar los desenlaces después de un ACV, ya que no hay evidencia que demuestre que la anticoagulación inmediata se asocie con mayor funcionalidad o disminución de futuros ACV; por el contrario, sí existe un riesgo aumentado de hemorragias intra- o extracraneales que pueden poner en riesgo la vida del paciente (1,32).

Conclusiones

El ACV isquémico agudo es una patología con una carga alta de morbilidad en nuestro país y en el resto del mundo, siendo una emergencia neurológica frecuente y la segunda causa de muerte en el mundo después de la enfermedad coronaria. Ello genera costos elevados en su tratamiento y recuperación, y un gran impacto socioeconómico, por lo que es indispensable para el clínico estar actualizado en cuanto a los avances diagnósticos y terapéuticos que han demostrado impactar en términos de calidad de vida y funcionalidad en estos pacientes. El enfoque ordenado, basado en un algoritmo de atención (figura 6) del ACV isquémico agudo, permite abordar de manera integral y eficaz a estos pacientes, teniendo en cuenta que, basados en la mejor evidencia disponible y en las guías internacionales, contamos con una ventana de tiempo de hasta 4,5 h para trombólisis intravenosa y de hasta 6 h para realizar trombectomía mecánica en pacientes con oclusión de gran vaso y neuroimágenes con evidencia de penumbra isquémica realizando mismatch por resonancia magnética, lo que mejora los desenlaces clínicos y las complicaciones a corto y mediano plazo. Es importante contar con políticas en salud pública enfocadas en educar a la comunidad colombiana en reconocer de manera oportuna los síntomas de un ACV para acudir rápidamente a un centro médico que garantice la atención necesaria.

Referencias

1. Ministerio de Salud y Protección Social. Guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del episodio agudo del ataque cerebrovascular isquémico en población mayor de 18 años. Vol. 54, CINET. 2015. 1-52.

2. Arauz A, Ruiz-Franco A. Enfermedad vascular cerebral. Rev Fac Med (Méx.). 2012;55(3):11-21.
3. Mikulik R, Wahlgren N. Treatment of acute stroke: an update. J Intern Med. 2015;278:145-65.
4. Maldonado N, Kazmi S, Suárez J. Update in the management of acute ischemic stroke. Crit Care Clin. 014;30:673-97.
5. Benjamin EJ, Blaha MJ, Chiuve SE, Cushman M. Heart disease and stroke statistics-2017 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2017;135:146-603.
6. Pradilla AG, Vesga BE, León-Sarmiento FE. Estudio neuroepidemiológico nacional (Epineuro) colombiano. Rev Panam Salud Pública. 2003;14:104-11.
7. Macrez R, Ali C, Toutirais O, et al. Stroke and the immune system: from pathophysiology to new therapeutic strategies. Lancet Neurol. 2011;10:471.
8. Lin MP, Liebeskind DS. Imaging of ischemic stroke. Continuum (NY). 2016;22:1399-423.
9. Jordan JD, Powers WJ. Cerebral Autoregulation and Acute Ischemic Stroke. Am J Hypertens. 2012;25:946-50.

4. CONCEPTO DE AUDITORÍA

Teniendo en cuenta lo anterior y a la luz de las disposiciones legales que señalan los atributos de la calidad del servicio asistencial que son: Accesibilidad, Continuidad, Oportunidad, Pertinencia, Racionalidad Técnico-científica y Seguridad, se concluyó en este aspecto lo presentado a continuación:

Accesibilidad: De acuerdo con los registros de la historia clínica la paciente accedió sin ningún tipo de condicionamiento administrativo a los diferentes servicios de Urgencias y Hospitalización de la Clínica del Occidente, de acuerdo a sus condiciones clínicas y por parte de la Aseguradora se autorizaron todos los servicios requeridos en la hospitalización, así como los diferentes procedimientos.

Continuidad: A la paciente se le realizaron todas las valoraciones e intervenciones requeridas durante su atención, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basadas en el conocimiento científico del personal asistencial que estuvo a cargo de su tratamiento por un equipo médico interdisciplinario integrado por médico urgencias y Neurología, brindada en la institución.

Oportunidad: De acuerdo a los registros de la historia clínica se evidencia demora en la realización de La tomografía axial computarizada de cráneo. Examen que se debió realizar en la primera hora desde el ingreso a fin de determinar, sí, se estaba frente a un ACV. La paciente ingresa a la 01:28 am al servicio de urgencias es valorada por medico quien considera que cursa con un cuadro de alteración de la conciencia, solicita TOMOGRAFIA DE CRANEO, paraclínicos. Es valorada nuevamente con estos reportes 21/03/15 05:26, donde describen reporte de TAC sin evidencia de lesiones aparentes.

Se presenta inoportunidad en la realización de la RMN cerebral. Una vez el reporte del tac no evidencia alteraciones, Neurólogo por hallazgo del examen físico indica RMN cerebral el día 21/03/15 05:32 Neurología 22/03/15 05:48 evalúa a la paciente con el reporte de RMN cerebral. En la que se hace el diagnostico Infarto anterior brazo capsula interna y parietal.

Pertinencia: Al respecto se considera que el manejo médico, los procedimientos realizados y los estudios paraclínicos ordenados fueron pertinentes de acuerdo con el cuadro clínico de la paciente y fueron efectuados de acuerdo a los criterios de racionalidad técnico-científica. Al ingreso, por los datos aportados por los familiares, el examen físico realizado, se consideró que cursaba con alteración del estado de conciencia. Se inició abordaje de estudios, para descartar alteración electrolítica, así como TAC de cráneo para evaluar estructuras cerebrales. De esta manera evaluar posibilidad de ECV. Se ingresa a monitorización. Es valorada por Neurología con reporte de paraclínicos. Ante el reporte de TAC, en normalidad. Por hallazgos al examen neurológico, descrito por neurología, paciente consciente


alerta activa afásica pares craneanos oculomotores sin alteración pares bajos normales no asimetría facial, fuerza hemiparesia derecha extremidades no signos meníngeos o cerebelosos rmt ++/++++ . Indica RMN cerebro, EEG y Hospitalizar. Se hace diagnóstico de otras convulsiones no específicas. Con el reporte de la RMN se avanza estudios de extensión para posibles causas; pero familiar de la paciente solicita salida voluntaria.

Racionalidad Técnico-científica: El manejo médico brindado desde el ingreso hasta el egreso de la paciente, se considera ajustado a las Guías clínicas institucionales y a la evidencia científica soportada en la bibliografía y literatura médica, para el abordaje de pacientes con episodio sincopal. Paciente quien presento cuadro bizarro. Al ingreso por datos aportados por familiares, se orientó estudios a episodio convulsivo novo. Se descartó alteración metabólica, electrolítica, estructural con la TAC de cráneo. Por sospecha se avanzó en estudios con la RMN cerebral.

Seguridad: La atención brindada a la paciente no se vio afectada desde el punto de vista de la seguridad clínica.

5. GESTION DE AUDITORIA

Se revisa atención de la paciente, en la cual se puede evidenciar que se presentó inoportunidad en la toma de la Tomografía axial de Cráneo. Por recomendación de las guías de manejo esta se debe realizar en la primera hora desde el ingreso de la paciente. Así mismo la RMN de cerebro debió realizarse en menor tiempo para caracterizar la lesión de esta forma iniciar manejo, no superando el periodo de ventana. De esta forma garantizar la viabilidad del tejido neuronal.



ID Firma: 3d6a5a5b-455a-895c-77e4-689d12
Titular: COLMÉDICA
Emitido por: Olimpia T ECP Sub

Alexandra Soto Rondón

Medico Auditor Colmédica Medicina prepagada.